Βρωνίδου - Μπομπότά

Λανίτης Σοφοκλής

Παλιούρα Ελένη
Ενδοκρινολογικού Τμήματος,
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.

Παλιούρα Ελένη
Ενδοκρινολογικού Τμήματος,
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.

Καλογεράς Νικόλαος

Σαλτίκη Αικατερίνη

Στεφανάκη Αικατερίνη

Παπαθεοδώρου Αθανάσιος

Παγκόσμια Μέρα Θυρεοειδούς
23 5 2024
Χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του θυρεοειδούς
Καλοήθεις παθήσεις
Σοφοκλής Λανίτης
Διευθυντής
ειρουργική Κλινική – Κοργιαλλένειο Μπενάκειο
Ε.Ε.Σ
Κουνάδη Ευαγγελία
ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ,
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ,
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
Μπέσιας Νικόλαος
Διευθυντής Επιστημονικά Υπεύθυνος
Αγγειοχειρουργικού Τμήματος,
Τομέα Χειρ. Χειρουργικού Τομέα,
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.

Λανίτης Σοφοκλής
ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ,
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
ΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ 2024

Τριάντος Στυλιανός
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.
ΗΜΕΡΙΔΑ
για την
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ 2024

- Ο θυρεοειδής αδένας βρίσκεται έμπροσθεν της τραχείας
- Έχει δύο λοβούς, με τυπικές διαστάσεις 5 επί 3 επί 1,5 εκατοστά
- Το κεντρικό τμήμα του αδένα που ονομάζεται ισθμός εντοπίζεται μπροστά από το 2ο, 3ο και 4ο τραχειακό ημικρίκιο, στο ύψος του 5ου, 6ου και 7ου αυχενικού σπονδύλου.
- Ο θυρεοειδής περικλείει την τραχεία
- Γειτνιάζει με τις καρωτιδικές αρτηρίες, τις έσω σφαγιτιδες φλέβες, τον οισοφάγο, τις γλώσσα.
- Το συνολικό του βάρος είναι γύρω στα 20-25 γραμμάρια.
Αθανασιάδης Γεώργιος

εκθέτουν όμως λιγότερο ή δεν εκθέτουν σε ιοντίζουσα ακτινοβολία.
Σαμαρτζής Αλέξανδρος
Κουνάδη Ευαγγελία
Νικόλαος

Καλογερής Νικόλαος

Παπαθεοδώρου Αθανάσιος